

(16)高齢者における褥瘡の院内発生率

分子：分母のうち、褥瘡対策に関する治療計画書において、NPUAP 分類にて Stage II 以上、もしくは DESIGN 評価表で D2 以上と判定された院内の新規発生の褥瘡を有する患者数（DU=測定不能は含まない）

分母：入院時に褥瘡あるいは褥瘡発生リスクがある 75 歳以上(入院時)の在院患者延べ数（当該高齢患者数に当該高齢患者の総在院日数を乗じたもの）。

褥瘡の危険因子は、栄養失調有、関節拘縮有、浮腫有、移乗や平地歩行で全介助のいずれかとする。ただし、片麻痺、下肢の単麻痺、四肢麻痺、無酸素脳麻痺、胸部二分脊椎、腰部二分脊椎、仙骨部二分脊椎、二分脊椎、潜在性二分脊椎のうち、いずれか 1 つ以上の傷病がある患者、および退院時転帰が死亡であった患者は除外。

収集期間： DPC 以外病院：平成 27 年 10 月～平成 28 年 3 月

褥瘡は、持続的圧迫によって皮膚や皮下脂肪組織、筋肉への血流が途絶え、これらの組織が死んでしまった状態です。この状態を壊死といいます。私たちは、眠っている間も無意識のうちに寝返りを打ち、長時間座るときにはお尻を浮かせながら、同じ部位に長時間の圧迫が加わらないようにしています（このような動作を体位変換といいます）。そのため、自分で体位変換できない人に発生しやすくなります。特に高齢者は、加齢による皮膚や皮下脂肪組織、筋肉や血管の衰えがベースにありますので、自分で体位変換できないひとは褥瘡ができやすく、また、治癒しにくい特徴があります。

褥瘡を予防するためには原則 2 時間おきの体位変換が必要であると言われてしています。

指標 16：高齢者における褥瘡の院内発生率

医療機関種別	医療機関コード	医療機関名	母数	分子	割合
DPC以外病院	012014410	西小樽病院	383	0	0.0%
DPC以外病院	012014956	小樽病院	31141	0	0.0%
DPC以外病院	033010225	岩泉病院	9260	12	0.1%
DPC以外病院	072012129	川俣病院	9472	39	0.4%
DPC以外病院	080110213	茨城県立こども病院	31	0	0.0%
DPC以外病院	082910222	神栖済生会病院	8114	32	0.4%
DPC以外病院	111700368	鴻巣病院	4236	0	0.0%
DPC以外病院	130710764	向島病院	20121	45	0.2%
DPC以外病院	140200014	神奈川県病院	21997	58	0.3%
DPC以外病院	140800102	若草病院	18	13	72.2%
DPC以外病院	142000628	平塚病院	21283	0	0.0%
DPC以外病院	230400417	愛知県済生会リハビリテーション	29700	6	0.0%
DPC以外病院	242705150	明和病院	31591	7	0.0%
DPC以外病院	275601460	新泉南病院	3873	2	0.1%
DPC以外病院	320610758	江津総合病院	24750	30	0.1%
DPC以外病院	338800160	吉備病院	13872	5	0.0%
DPC以外病院	340511665	呉病院	23328	48	0.2%
DPC以外病院	350311776	湯田温泉病院	5005	46	0.9%
DPC以外病院	357810895	下関市立豊浦病院	34109	17	0.0%
DPC以外病院	377011385	香川県済生会病院	12787	23	0.2%
DPC以外病院	380210603	今治第二病院	4715	1	0.0%
DPC以外病院	404419164	大牟田病院	23480	26	0.1%
DPC以外病院	405519616	飯塚嘉穂病院	15496	8	0.1%
DPC以外病院	438212331	みすみ病院	23451	16	0.1%
DPC以外病院	458110194	日向病院	21577	7	0.0%
DPC以外病院	460110910	鹿児島病院	3280	2	0.1%
		DPC以外病院 全体	397070	443	0.1%

指標 16：高齢者における褥瘡の院内発生率

